

腔用外用薬

ジンレディケア®

第1類医薬品

- ☆ ジンレディケアは、有効成分ミコナゾール硝酸塩を配合する再発した腔カンジダを治療するお薬です。
- ☆ ミコナゾール硝酸塩は、腔カンジダの起因菌であるカンジダ菌に強い抗菌作用を示すことで、腔カンジダを治療します。
- ☆ ジンレディケアは、腔内に直接投与することで腔カンジダの再発に伴う症状に効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 初めて発症したと思われる人(初めて症状があらわれた場合は、他の疾病が原因の場合があり、その場合は医師の診断を受ける必要があります。)
- (2) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(本剤の使用により再びアレルギー症状を起こす可能性があります。)
- (3) 15歳未満又は60歳以上の人(15歳未満は初めて発症した可能性が高く、60歳以上の人は他の疾患の可能性や他の菌による複合感染のリスクが高まることを考慮する必要があります、自己判断が難しいため)
- (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人(薬の使用には慎重を期し、医師の診断を受ける必要があります。)
- (5) 発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色のついた又は血に染まったおりもの、魚臭いおりもの、生理の停止、腔からの不規則又は異常な出血、腔又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれがある人(別の疾病の可能性があり、医師の診断を受ける必要があります。)
- (6) 次の診断を受けた人
糖尿病(頻繁に本疾病を繰り返す可能性が高いので、医師の診断を受ける必要があります。)
- (7) フルファリン等の抗凝血剤を服用している人(フルファリンの作用である出血傾向が強くなる場合があります。)
- (8) 本疾病を頻繁に繰り返している人(1~2カ月に1回又は6カ月以内に2回以上)
- (9) 腔カンジダの再発が分からない人(自己判断できない場合は、医師の診断を受ける必要があります。)



2. 次の部位には使用しないでください。

腔内以外の部位(本剤は腔内のカンジダ菌による感染のみに効果があります。)

3. 本剤を使用中に次の医薬品を外陰部に使用しないでください。

カンジダ治療薬以外の外皮用薬(症状が悪化する又は治療を遅らせるおそれがあります。)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人(医師から処方されている薬に影響したり、本剤と同じ薬を使用している可能性もあります。)
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(薬などでアレルギーを起こした人は、本剤でも起こる可能性があります。)
- (3) 授乳中の人(薬の使用には慎重を期す必要があります。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
腔以外	じんましん、かゆみ

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
腔	かゆみ、発赤、痛み、熱感、刺激感

(本剤によるアレルギー症状であるか、本剤の薬理作用が強くあらわれたものであると考えられ、このような場合、同じ薬を続けて使用すると症状がさらに悪化する可能性があります。)

4. 3日間使用しても症状の改善がみられない場合又は6日間使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。(症状が重いか他の疾病による可能性があります。)

効能・効果

腔カンジダの再発（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）

〔解説〕腔カンジダは、カンジダ菌によって起こる腔の疾病で、腔のかゆみ、おりもの（白色）、発赤、熱感、痛みを生じます。

用法・用量

成人（15歳以上60歳未満）、1日1回1個を就寝前に腔深部に挿入してください。なお、6日間連続して使用してください。

ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。

*ご使用前に入浴するか、ぬるま湯で患部を清潔にし、使用してください。

年齢	1回量	1日使用回数
15歳以上60歳未満	1個	1回（就寝前）
15歳未満60歳以上	使用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤が柔らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (3)腔内のみ使用してください。
- (4)使用前によく手を洗ってください。
- (5)アプリケーターは使用しないでください。（衛生上好ましくないため）
- (6)挿入後しばらくは異物感が残りますが心配はありません。
- (7)挿入後20~30分間は激しい運動は避けましょう。
- (8)途中で症状が消失しても、使用開始から6日間使用してください。
- (9)生理中の使用は避け、使用中に生理になった場合は本剤の使用を中止してください。その場合は治癒等の確認が必要であることから医師の診療を受けてください。（生理中は薬剤が流れ出し、効果が十分得られない場合があります。）

【腔坐剤の使い方】



成分・分量（1個中）

成分	分量	働き
ミコナゾール硝酸塩	100mg	カンジダ菌に対して強い抗菌作用を示します。

添加物としてハードファットを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に保管してください。（本剤は体温程度で溶けるため、購入後はなるべく冷蔵庫で保管してください。）
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)保管する場合は、坐剤の先を下に向けて外箱に入れ、外箱のマークに従って立てて保管してください。（坐剤の変形を防ぐため）
- (4)コンドームやペッサリー等の避妊用ラテックス製品との接触を避けてください。（これらの製品が劣化・破損することがあります。）
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」

〒651-2142 神戸市西区二ツ屋1-2-15 電話 (078)929-0112

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日、弊社休日を除く）



発売元
摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1



製造販売元
コーア商事株式会社
横浜市港北区箕輪町2丁目17番5号