

外陰用外用薬

ジンレディケア®クリーム

第1類医薬品

- ★ ジンレディケアクリームは、有効成分ミコナゾール硝酸塩を配合した外陰用のお薬で、再発した膣カンジダによる発疹を伴うかゆみを抑えます。
- ★ ミコナゾール硝酸塩は、膣カンジダの起因菌であるカンジダ菌に強い抗菌作用を示すことで、膣カンジダに伴う諸症状を治療します。
- ★ ジンレディケアクリームは、ベタつかず、使用感の良いクリーム剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1)初めて発症したと思われる人(初めて症状があらわれた場合は、他の疾病が原因の場合があり、その場合は医師の診断を受ける必要があります。)
- (2)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(本剤の使用により再びアレルギー症状を起こす可能性があります。)
- (3)15歳未満又は60歳以上の人(15歳未満は初めて発症した可能性が高く、60歳以上の人には他の疾患の可能性や他の菌による複合感染のリスクが高まるなどを考慮する必要があります、自己判断が難しいため)
- (4)妊娠又は妊娠していると思われる人(薬の使用には慎重を期し、医師の診断を受ける必要があります。)
- (5)発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色のついた又は血に染まったありもの、魚臭いありもの、生理の停止、膣からの不規則又は異常な出血、膣又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれがある人(別の疾患の可能性がありますので、医師の診断を受ける必要があります。)
- (6)次の診断を受けた人
糖尿病(頻繁に本疾病を繰り返す可能性が高いので、医師の診断を受ける必要があります。)
- (7)本疾病を頻繁に繰り返している人(1~2カ月に1回又は6カ月以内に2回以上)
- (8)膣カンジダの再発か分からぬ人(自己判断できない場合は、医師の診断を受ける必要があります。)



2. 次の部位には使用しないでください。

膣周辺(外陰)以外の部位(本剤は外陰部以外に使用する製品ではありません。)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人(医師から処方されている薬に影響したり、本剤と同じ薬を使用している可能性もあります。)
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(薬などでアレルギーを起こした人は、本剤でも起こる可能性があります。)
- (3)授乳中の人(薬の使用には慎重を期す必要があります。)

2. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
膣周辺の皮膚(外陰)	かゆみ、発疹・発赤、かぶれ、熱感、びらん、刺激感、小水疱、はれ、乾燥・亀裂、落屑

(本剤によるアレルギー症状であるか、本剤の薬理作用が強くあらわれたものであると考えられ、このような場合、同じ薬を続けて使用すると症状がさらに悪化する可能性があります。)

3. 3日間使用しても症状の改善がみられない場合は又は6日間使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。特に、クリーム単独使用の場合は、自己判断で治療をすることなく医師の診療を受けてください。(症状が重いか他の疾患による可能性があります。)

効能・効果

膣カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみ(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)

ただし、膣症状(ありもの、熱感等)を伴う場合は、必ず膣剤(膣に挿入する薬)を併用してください。

〔注意〕本剤はカンジダによる外陰部の症状を改善しますが、膣内の治療を行うものではありません。

〔解説〕外陰部の症状は、膣の中にいるカンジダ菌が外陰部に影響を及ぼすことによっておこる疾患で、かゆみの他、発疹、熱感を生じます。外陰部皮膚に発赤やただれ等の発疹を伴うかゆみがあらわれた場合にお使いください。

用法・用量

成人(15歳以上60歳未満)、1日2~3回、適量を患部に塗布してください。

ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。

(1)外陰部症状のみの場合:本剤を使用してください。腔剤(腔に挿入する薬)との併用が望まれます。

(2)腔症状(ありもの、熱感等)を伴う場合:本剤に腔剤(腔に挿入する薬)を併用してください。

<用法・用量に関する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

(3)腔周辺(外陰)にのみ使用してください。


(4)使用前後によく手を洗ってください。

(5)生理中の使用は避け、使用中に生理になった場合は本剤の使用を中止してください。その場合は治癒等の確認が必要であることから医師の診療を受けてください。(生理中は薬剤が流され、効果が十分得られない場合があります。)

*ご使用の前に入浴するか、ぬるま湯で患部を清潔にし、使用してください。

【チューブの穴の開け方】

キャップを逆さにして、突起物をチューブの先端に強く押し当ててください。



成分・分量(1g中)

成 分	分 量	働 き
ミコナゾール硝酸塩	10mg	カンジダ菌に対して強い抗菌作用を示します。

添加物として自己乳化型モノステアリン酸グリセリル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、セタノール、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、プロピルパラベン、メチルパラベンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)コンドームやペッサリー等の避妊用ラテックス製品との接触を避けください。(これらの製品が劣化・破損することがあります。)

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。



お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」

〒651-2142 神戸市西区二ツ屋1-2-15 電話 (078)929-0112

受付時間: 9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)

発 売 元



摩耶堂製薬株式会社

神戸市西区玉津町居住65-1

製造販売元

KOA

コーア商事株式会社

横浜市港北区箕輪町2丁目17番5号