

第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

湿疹アレルギー用薬
じんましん
かぶれ ピルケ

アレルギー性疾患は、その人の体質、健康状態によっておこるアレルギー反応にもとづくものといわれております。この疾患の原因がヒスタミン、アセチルコリン等に基因することが知られており、この考え方により抗ヒスタミン剤、抗アセチルコリン剤が出現しました。

ピルケはサリチル酸ジフェンヒドラミン(抗ヒスタミン剤)、ビタミン類を配合しアレルギー性疾患の改善にすぐれた効果をあらわします。



使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。排尿困難
(5) 次の診断を受けた人。緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌尿器	排尿困難

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気

4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕
じんましん、湿疹、かぶれ、かゆみ、皮膚炎

〔用法・用量〕

次の量を食後に水又はお湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	3錠	3回
11才以上15才未満	2錠	
5才以上11才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕

9錠中に次の成分を含有しています。

[サリチル酸ジフェニヒドラミン…100mg リボフラビン………10mg]
[ピリドキシン塩酸塩……………40mg ニコチン酸アミド………40mg]
添加物として、ステアリン酸Mg、タルク、CMC、トウモロコシデンプン、セルロース、デキストリン、メタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖水和物、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、マクロゴール、アラビアゴム、ゼラチン、炭酸Ca、酸化チタン、リン酸水素Ca水和物、白糖、カルナウバロウを含有しています。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤に配合されているリボフラビンにより尿が黄色になることがあります、心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
あるいは下記にお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

電話 045(593)2136

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22