

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

アレルギー性疾患治療剤

第2類医薬品

ケラスギー
KERASGYI

〔特 徴〕

じんましん、湿疹、かぶれ等の各種皮膚疾患などアレルギー性疾患の原因は、体内の抗原抗体反応の結果遊離したヒスタミン等の化学物質の作用によるものです。このようなアレルギー性疾患の治療法には、じんましん、湿疹等の起こった部分に軟膏を塗ることも好結果を期待出来ますが、さらにからだの中に起こったアレルギー反応を改善する抗アレルギー剤の服用が適切です。

ケラスギーは、アレルギー症状を改善するd-クロルフェニラミンマレイン酸塩、グリチルリチン酸二カリウムの他、ビタミンB₆を配合し、からだの中に起こっているアレルギー反応を改善しながら、じんましん、湿疹などのアレルギー性疾患を治療する、服用しやすい糖衣錠です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬）
 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
 3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、腎臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
□のかわき

〔効能・効果〕

じんましん、湿疹、かぶれ、かゆみ、鼻炎

〔用法・用量〕

年 齢	1回量	用 法
成人(15才以上)	3錠	1日3回服用してください。
8才以上15才未満	2錠	
5才以上 8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。

〔成 分〕 1日量(9錠)中

成 分	分量	は た ら き
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	4.5mg	アレルギー症状をおさえ、炎症やかゆみをしずめます。さらに鼻炎にも効果を発揮します。
グリチルリチン酸二カリウム	108.0mg	
ビタミンB ₆	18.0mg	欠乏・代謝障害による皮膚疾患の症状を改善します。

添加物として、無水リン酸水素カルシウム、乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、D-マンニトール、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、硬化油、精製白糖、アラビアゴム末、精製ゼラチン、タルク、硫酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、カルナウバロウ及びミツロウを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)

受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

フリーダイヤル ☎ 0120-149-931



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

