

※2014年11月改訂

※
使用に際しては、この説明文書を
必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
顔面、粘膜(鼻腔、膈など)や陰股部(陰のうなど)
2. そのままの液では使用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者*に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は*家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 創傷面が広範囲の人あるいは深い傷やひどいやけどの人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者*に相談してください。

(1) 使用中又は*使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚*	発疹・発赤、灼熱感、かゆみ

(2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能又は効果】

手指・創傷面の殺菌・消毒、口腔内の殺菌・消毒

【用法及び用量】

- (1) 手指の殺菌・消毒 ベンザルコニウム塩化物として0.05~0.1%
- (2) 創傷面の殺菌・消毒 ベンザルコニウム塩化物として0.01~0.025%
- (3) 口腔内の殺菌・消毒 ベンザルコニウム塩化物として0.005~0.01%

<用法・用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を守ってください。
2. 原液のまま使用しないでください。
3. 外用にのみ使用し、内服しないでください。

必ずうすめてご使用ください



第3類医薬品

殺菌消毒薬

飲用不可

日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液 (10%)

ヤクザールP

BENZALKONIUM CHLORIDE SOLUTION

500mL

製造販売元

ヤクハン製薬株式会社

北海道北広島市北の里27番地

連絡先: ヤクハン製薬株式会社 学術情報グループ*

電話: 011-373-1097

受付時間: 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)*

4. 原液又は*濃厚液が皮膚*に付着した場合は、炎症を起こすことがあるので、すぐに水で洗い流してください。
5. 眼*に入らないよう注意してください。万一、眼*に入った場合には、すぐに水又は*ぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
6. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
7. 患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿などに浸して貼付しないでください。
8. 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用してください。

【成分・分量】

本品100mL中 ベンザルコニウム塩化物50 20g

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 誤用の原因になったり品質が変わるおそれがありますので、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 皮革製品に付着した場合には、変質させることがありますので注意してください。
- (6) 染色した布地は退色することがありますので注意してください。

<希釈方法>

本品のキャップの内側には、ねじ山がついています。

その最上部まで本剤を注いだとき、約5mLとなります。

- ・ 100倍液: 本剤キャップ一杯をとり、水500mLにうすめます。
- ・ 200倍液: 本剤キャップ一杯をとり、水1Lにうすめます。
- ・ 400倍液: 本剤キャップ一杯をとり、水2Lにうすめます。
- ・ 500倍液: 本剤キャップ一杯をとり、水2.5Lにうすめます。
- ・ 1000倍液: 本剤キャップ一杯をとり、水5Lにうすめます。
- ・ 2000倍液: 本剤キャップ一杯をとり、水10Lにうすめます。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話: 0120-149-931 (フリーダイヤル)

使用期限(上段)、製造番号(下段)は底面に記載



キャップ: PP
容器: PE



4

212324K