




<p>0.1% アクリノール液 「ニッコ-A」 ACRINOL SOLUTION 50mL</p>  <p>製造販売元 日興製薬株式会社 岐阜県羽島市江吉良町1593</p>	<p>【成分・分量】 アクリノール 0.1W/V% (成分・分量に関する注意) 本剤に付着すると黄色に着色し、褐色しにくいので、注意すること。</p> <p>【保管及び取扱い上の注意】 ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管すること。 ②小児の手の届かない所に保管すること。 ③他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)</p> <p>紙ラベル キャップ:PP 中 栓:PE ガラス:管轄</p> <p>医薬品</p>  <p>4 987291 810517</p>	<p>0.1% アクリノール液 「ニッコ-A」 ACRINOL SOLUTION 50mL</p>  <p>製造販売元 日興製薬株式会社 岐阜県羽島市江吉良町1593</p>	<p>2002年5月作成</p> <p>使用に際して、この説明を必ず読むこと。また、必要な時に読めるように大切に保管すること。</p> <p>△使用上の注意</p> <p>【相談すること】 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。 ①重症の湿疹を患っている人。 ②本人又は家族がアレルギー体質の人。 ③薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ④患部が広範囲の人。 ⑤深い傷やひどいやけどの人。 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この製剤を持って医師又は薬剤師に相談すること。 ①使用後、次の症状があらわれた場合 <table border="1" data-bbox="1355 885 1534 933"> <tr><td>顔面発赤</td><td>発疹</td></tr> <tr><td>皮膚</td><td>発疹・発赤</td></tr> <tr><td>かゆみ</td><td></td></tr> </table> ②5～8日間使用しても症状がよくなるない場合。</p> <p>【効能・効果】【用法・用量】</p> <table border="1" data-bbox="1355 965 1534 1013"> <tr><td>効果:すりぬきし薬、なき薬、殺菌薬、保湿剤</td><td>用法:本品をそのまま塗布する。患部の乾燥・消毒</td></tr> <tr><td>効果:口腔内の殺菌・消毒</td><td>用法:本品をそのまま、又は水で2倍量で希釈して塗布する。</td></tr> </table> <p>【用法・用量に関する注意】 ①用法・用量を厳守すること。 ②小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。 ③目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。 ④外用にのみ使用し、内服しないこと。</p>	顔面発赤	発疹	皮膚	発疹・発赤	かゆみ		効果:すりぬきし薬、なき薬、殺菌薬、保湿剤	用法:本品をそのまま塗布する。患部の乾燥・消毒	効果:口腔内の殺菌・消毒	用法:本品をそのまま、又は水で2倍量で希釈して塗布する。
顔面発赤	発疹												
皮膚	発疹・発赤												
かゆみ													
効果:すりぬきし薬、なき薬、殺菌薬、保湿剤	用法:本品をそのまま塗布する。患部の乾燥・消毒												
効果:口腔内の殺菌・消毒	用法:本品をそのまま、又は水で2倍量で希釈して塗布する。												