

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

くりかえす
粉ふき・ピリピリ肌 乾燥肌
保水構造が乱れた顔肌に



外皮用薬
第2類医薬品
販売名: さいき

Saikiは、肌内部の乱れた保水構造を奥底※から修復し
乾きのない肌に導く乾燥肌治療薬です


※基底層

製品特徴

1. ローションタイプの乾燥肌治療薬です
2. 有効成分が、肌内部の保水構造「ラメラ構造」の乱れを正常にし、肌の保水力を回復します
3. 乾燥をくり返す肌を、内側からしっかりと潤う乾きのない肌に導きます

乾燥肌と肌の保水構造(ラメラ構造)の深い関係

「ラメラ構造」とは、肌の保水機構の重要な部分で、水分と油分の層でできています。肌の細胞と細胞の間に規則的に並んでおり、肌の水分を守っています。この構造が乱れていると、いくら保湿しても、隙間から水分が逃げてしまい、乾燥が起こりやすくなったり、刺激に弱い肌になってしまいます



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
 - (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
 - (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

乾皮症、小児の乾燥性皮膚、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、しもやけ(ただれを除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、またはガーゼなどにのばして貼ってください

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)使用のつどキャップをしっかりとしめること
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3)目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4)外用にのみ使用すること

成分・分量

100g中

成分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3 g	ラメラ構造を修復し、整えます 角質に潤いと柔軟性を与えます
グリチルリチン酸二カリウム	0.5 g	肌の炎症を抑えます
アラントイン	0.2 g	荒れたり、ひび割れた皮膚組織の 修復を助けます

添加物として、グリセリン、ジプロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、オリーブ油、スクワラン、dl-ピロリドンカルボン酸Na、水添大豆リン脂質、安息香酸、キサンタンガム、ソルビン酸、コレステロール、L-アスパラギン酸、L-アルギニン、グリシン、DL-アラニン、エデト酸Na、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、リノール酸エチル、ベヘン酸、pH調節剤を含有する

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先(お客様相談室)
 **0120-5884-01**
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

10135615 MADE IN JAPAN