

この説明書は、お薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

第3類医薬品



特 徴

クミアイメンタムは、すぐれた血液循環作用と消炎作用をもつ外用薬です。ひび・あかぎれなどに、ご家庭の常備薬としてお役立てください。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 湿潤やただれのひどい人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

ひび、あかぎれ、のどの痛み

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布又は塗擦してください。

用法・用量に関連する注意

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

成分・分量

100g中

成分	含量	はたらき
dℓ-カンフル	9.5g	局所を刺激して血行を促進します。
ℓ-メントール	1.5g	清涼性があり、局所を刺激して、次に知覚を麻痺して、痛みを鎮め、痒みを抑えます。
サリチル酸メチル	4.0g	血管を刺激して血行を良くし、腫れや炎症を鎮めます。また、サリチル酸として鎮痛効果もあらわれます。
ユーカリ油	2.0g	ユーカリの葉から得た精油で、清涼・消炎作用があります。

添加物として、ワセリン、パラフィン、ラノリンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口

電話：0238-46-2013

[月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)]

販売者 **全国農業協同組合連合会**

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**

山形県東置賜郡川西町大字西大塚930