

この説明書は、使用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

第2類医薬品

外用 にきび治療薬 顔 剤 ユキワリミン

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 湿潤やただれのひどい人
 - 深い傷やひどいやけどの人
 - 医師の治療を受けている人

- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ等

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

面皰、汗皰、濕疹、白斑、丘疹、疥癬、色班症、毒虫刺傷、膿皰疹、水虫、田虫、ヒビ、霜焼、火傷、創傷

用語解説

面皰(めんほう)：顔のにきび 汗皰(かんほう)：膿みにきび 濕疹(しっしん)：湿疹

【用法・用量】

綿あるいは紙に適量をつけ、又は、手にとり塗布して下さい。

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を守って下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- 外用にのみ使用して下さい。

【成分・分量】

100g中

有効成分	雪割草アルコール浸液	5 g
	サリチル酸	20 mg
	4-ニトロフェノールナトリウム二水和物	5 mg
	d-カンフル	1 mg
	ピリドキシン塩酸塩	0.5 mg
	銅クロロフィリンナトリウム	0.5 mg
添 加 物	精製水、アルギン酸ナトリウム、フェロシアン化カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウム、水酸化ナトリウム、硫酸ナトリウム、硫酸アンモニウム、香料	

【保管及び取扱い上の注意】

- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れ替えないで下さい。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包 装】

100mL

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

原沢製薬工業株式会社 開発本部 お客様相談室

電話：(03)3441-5191(大代表)

受付時間：9:30～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売  ハラザキ

原沢製薬工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番17号