

[メディカルローション]


こんな大人のニキビに悩んでいませんか？

- ✓ 痕が残りやすい
- ✓ アゴや口周りなど、フェイスラインに出来る
- ✓ 生理前など、同じ場所に繰り返し出来る

大人のニキビは、アゴや口周りなどのいわゆる“Uゾーン”にできやすく、ホルモンバランスの乱れやストレスなど様々な要因で繰り返しできたりします。また、炎症をおこして、なかなか治らなかったり、ひどくなると痕が残りやすくなります。

『アクネス25』は、メイクで隠せない「赤く目立つニキビ」の炎症をすばやくしずめる、**大人のニキビにも効く治療薬**です。

【ニキビのできるメカニズム】



ニキビをしっかり治す3つの効果

- 1 **古い角質を落とし、毛穴づまりをとる!**
 角質軟化作用で古い角質を取り除き、つまった毛穴を開きます。
- 2 **ニキビの原因菌を抑える!**
 ニキビの原因菌を殺菌して、増殖を防ぎます。
- 3 **赤み・はれ・炎症をしずめる!**
 できてしまったニキビの炎症をしずめます。
 傷ついた組織を修復する効果もあります。

うるおい成分
 配合

オイルフリー

無香料
 ・
 無着色

【アクネス25シリーズ】



ポイント使いにクリームタイプ
 メンソレータム®アクネス25
 メディカルクリーム

第2類医薬品 16g



フェイスラインにも使いやすい
 ローションタイプ
 メンソレータム®アクネス25
 メディカルローション

第2類医薬品 100mL



背中にも使いやすい
 ミストタイプ
 メンソレータム®アクネス25
 メディカルミスト

第2類医薬品 100mL

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名：メンソレータムアクネス25メディカルローション

第2類医薬品

ニキビ治療薬

100mL

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 湿潤やただれのひどい人
- (5) 深い傷やひどいやけどの人
- (6) 硬結(硬いしこり)のある重症の人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

4. その他

- (1) 本剤は傷口があると、しみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがあります。刺激が気になる場合は、使用を中止してください。
- (2) 本剤の使用により、皮膚が多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがあります。そのときは使用を一時中止してください。再び使用するときは間隔をあけて使用してください。

【効能・効果】

ニキビ

【用法・用量】

1日2回(朝・晩)、脱脂綿、ガーゼ等に適量を取り、肌にしばらくの間(2~3分間)押し当ててください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 使用前に腕の内側などに少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)があらわれた場合は使用をお避けください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成分】

| 有効成分 | 分量 |
|--------|--------|
| エタノール | 22.84% |
| サリチル酸 | 0.5% |
| アラントイン | 0.2% |

添加物：1, 3-ブチレングリコール、キサンタンガム、パラベン

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (5) 冷所に保管すると結晶が析出することがありますので、0℃以下での保管はお避けください。
- (6) エタノールを含むため、火の近くでの使用および保管はお避けください。
- (7) 衣服、寝具、家具、床等につかないように十分ご注意ください。
(材質によっては落ちにくいことや変色することがある)

お問い合わせ先；お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020/大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

Rohto **ロート製薬株式会社**
大阪市生野区巽西 1-8-1

401437901