

2012年10月(記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ側面およびチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

赤み・腫れの
跡が残りにくい

フキディア

第2類医薬品

にきび薬

販売名: フキディア

製品特徴

- 有効成分イブプロフェンピコノール配合の吹き出物治療薬です
- 吹き出物の赤み・腫れを鎮めて、吹き出物の成長をしっかり抑えて治していきます
- 肌を乾燥させない低刺激クリームタイプです
- 肌に優しい弱酸性です
- 患部に薄くのびてべたつかず、透明になるので、メイク前などの日中にもご使用いただけます

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと: 目や目の周囲



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬や化粧品などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(ヒリヒリ感)、はれ(腫脹)、乾燥化(つっぱり感)

3. 1ヶ月くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

吹き出物、にきび

用法・用量

1日数回、石けんなどで洗顔後、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 吹き出物・にきびのある部分にのみ使用し、周辺の広い部分や目・目の周辺には使用しないこと
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3) 目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4) 外用にのみ使用すること

成分・分量 100g中

成分	分量
イブプロフェンピコノール	3.0g


添加物として、オクチルドデカノール、1,3-ブチレングリコール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ステアリルアルコール、カルボキシビニルポリマー、ラウロマクロゴール、パラベン、ジイソプロパノールアミンを含有する

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
 - (2) 小児の手の届かないところに保管すること
 - (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 薬剤が飛び出る可能性があるので、最初にチューブ口を開けるときは、チューブを強く握りしめずに軽く持って開けてください

<チューブの穴の開け方>

キャップを逆にして、チューブの口元に強く押し当ててください



製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします


発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎0120-5884-01
受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
赤・ムベ・ジ | <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
辰巳化学株式会社
〒921-8164
石川県金沢市久安3-406

MADE IN JAPAN