

第②類医薬品

鎮痒消炎薬

この説明書は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。

J1

湿疹・皮膚炎に デキサメタゾン酢酸エステル配合

# エスアランド軟膏

ESALAN-D OINTMENT

## エスアランド軟膏の特長

### 1. 湿疹、皮膚炎などの炎症にすぐれた効果を発揮します

副腎皮質ホルモン剤（デキサメタゾン酢酸エステル）と消炎剤（グリチルレチン酸）を配合し、湿疹、皮膚炎などの炎症にすぐれた効果をあらわします。

### 2. 3種の鎮痒成分がガマンできないかゆみをおさえます

3種の鎮痒成分（クロタミトン、ジフェンヒドラミン、リドカイン）がそれぞれ異なったはたらきでかゆみをおさえていきます。

### 3. 化膿による悪化を防ぎながら症状を改善します

殺菌成分（クロルヘキシジン塩酸塩）が炎症によって抵抗力がおちている皮膚の細菌感染を防ぎます。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

#### 1. 次の部位には使用しないでください

- (1)水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2)目や目の周囲、外陰部、陰のう、粘膜等。

#### 2. 長期連用しないでください

### 🗨 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

## ■ 効能・効果

湿疹、皮膚炎、かゆみ、虫さされ、かぶれ、あせも、じんましん、ただれ、しもやけ

## ■ 用法・用量

1日1～3回、適量を患部に塗布します。

—チューブ穴のあけ方—  
キャップを逆にして、チューブに強く押し当てます。



### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

## ■ 成分と作用 1g中

成分	1g中	作用
デキサメタゾン酢酸エステル	0.25mg	湿疹、皮膚炎などの炎症をしずめます。
グリチルレチン酸	5mg	
クロタミトン	100mg	鎮痒作用により、つらいかゆみをやわらげます。
ジフェンヒドラミン	10mg	抗ヒスタミン作用により、炎症によるかゆみをおさえます。
リドカイン	20mg	局所麻酔作用により、すみやかにかゆみを軽減します。
クロルヘキシジン塩酸塩	2mg	細菌感染により症状が悪化するのを防ぎます。

添加物として、セタノール、ワセリン、パラフィン、サラシミツロウ、BHTを含有します。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは使用しないでください。

## ■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室  
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4