

【この説明書は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。】

# エースメタゾン

第2類医薬品

鎮痒消炎薬 湿疹、かぶれ、虫さされ、かゆみに

- エースメタゾンは、炎症を抑え、かゆみをしずめる副腎皮質ホルモン剤・デキサメタゾン酢酸エステル、かゆみをしずめるとともにデキサメタゾンを可溶化し患部への浸透性を高めるクロタミトン、かきこわしなどによる細菌感染の悪化を防ぐ殺菌剤・クロルヘキシジン塩酸塩を配合し、湿疹・かぶれ・虫さされ・かゆみなどにすぐれた効果をあらわします。
- エースメタゾンは、患部を保護する作用のある油脂性(ワセリン)基剤を使用していますので、なめらかでのびがよく、なじみやすく塗りやすい外用剤です。

## ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- ① 次の方は使用しないでください  
本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 次の部位には使用しないでください  
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- ③ 顔面には、広範囲に使用しないでください
- ④ 長期連用しないでください

### 相談すること

- ① 次の方は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 患部が広範囲の人。  
(5) 湿潤やただれのひどい人。
- ② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- ③ 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

湿疹、かぶれ、虫さされ、かゆみ、皮膚炎、じんましん、あせも、しもやけ

## 用法・用量

1日1～3回、適量を患部に塗布してください。

チューブ穴のあけ方（右図）  
キャップを逆にして、チューブに強く押し当てます。



### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)症状改善後は、すみやかに本剤の使用を中止してください。
- (4)外用にのみ使用してください。

## 成分 1g中

デキサメタゾン酢酸エステル…………… 0.25mg  
クロルヘキシジン塩酸塩…………… 2mg  
クロタミトン…………… 100mg

添加物：セタノール、ワセリン、パラフィン、サラシミツロウ、BHT

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限をすぎたものは使用しないでください。



### お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

⑦1



製造販売元

**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4