

開 け 口

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## パステル温感パッチ 第3類医薬品

### 【特徴】

- パステル温感パッチは、温感刺激と鎮痛消炎作用により、こりや痛みによく効きます。
- パステル温感パッチは、小さなサイズで貼りやすく、めだたない貼り薬です。



### 使用上の注意

#### ❌してはいけないこと

く守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

#### ■相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

### 【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

### 【用法・用量】

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部に貼付してください。

製造番号

使用期限



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂** 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電話 (0942)83-2112 受付時間 午前9:00～11:45 午後1:00～4:30(土、日、祝日を除く)

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3)患部の皮ふは清潔にして、汗などをよく拭きとってからお貼りください。
- (4)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5)皮ふの特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。
- (6)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはいりください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

### 【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量
サリチル酸メチル	5.0g
dl-カンフル	1.5g
l-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル	0.3g
ノニル酸ワニリリアミド	0.02g

添加物としてBHT、エステルガム、酸化亜鉛、生ゴム、ポリブテン、脂環族飽和炭化水素樹脂、三二酸化鉄、黒酸化鉄、黄色三二酸化鉄、その他2成分を含有する。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、保存袋に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### 【包装】

直径2.8cm/枚……156枚入 保存袋付