

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

# パテックス®フェルビナク5

- 特長**
- フェルビナクを1枚あたり5mg配合した消炎鎮痛テープ剤です。
  - フェルビナクは痛みに関係する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉のつらい痛み優れた効き目をあらわします。
  - 伸縮性に優れているので、関節部などの可動部にも使用しやすく、肌にピッタリとフィットします。
  - ライナー(プラスチックフィルム)が3ピース(中央剥離方式)なので、貼りやすくなっています。



## 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい  
(1) 本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人  
(2) ぜんそくを起こしたことがある人  
(3) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないで下さい  
(1) 目の周囲、粘膜等  
(2) 湿疹、かぶれ、傷口  
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 連続して2週間以上使用しないで下さい



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人  
(4) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ等

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

## 効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8  
電話 03(6667)3232  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

## 用法・用量

年齢	使用方法
15歳以上	表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付して下さい
15歳未満	使用しないで下さい

〈用法・用量に関連する注意〉 ●用法・用量を厳守して下さい ●本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい ●汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい ●皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい

## 成分(膏体100g中)

成分	含量	作用
フェルビナク	0.5g	炎症を抑え、痛みをやわらげます

添加物: l-メントール、流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、その他3成分

[1枚あたり(7cm×10cm)膏体量1g]

## 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、袋の口を折りまげて保管して下さい
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)