

あせも、かぶれ、ただれの治療に

鎮痒消炎薬 **レスタミンコーワクリーム**

赤ちゃんや女性のお肌に適した  
あせもとかぶれを治療する速乾性の  
パウダークリームです。

患部にぬりこみますと、まずかゆみが  
止まり、赤いポツポツが消えてまいります。  
かぶれやただれにも同様によく効きます。  
ぬったあとは、べとべとせずパウダーを  
ぬったような爽やかさが残ります。



●赤ちゃんは皮膚が弱く、汗や汚れによってあせもや  
ジクジクしたおむつかぶれを起こしやすいものです。  
ジクジクしたお肌の「乾き」を早め、同時にあせもとおむつなどの  
かぶれにすぐれた効きめをもつレスタミンコーワクリームで、赤ちゃん  
の弱いお肌をやさしく保護してあげてください。

●汗がでるとホコリや細菌がつきやすく、お肌を不潔にするばかり  
でなく、お肌に刺激を与えて炎症やあせもを起こしがちです。  
レスタミンコーワクリームは、お肌を清潔にし、同時にあせもを効果的  
にしずめます。

## ⚠ 使用上の注意



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って  
医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

## 効能・効果

あせも、ただれ、かぶれ、かゆみ

## 用法・用量

1日数回患部に適量を塗布する。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を守ること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4)外用にのみ使用すること。


## 成分・分量(1g中)

成分・分量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩 10.0mg	あせも・ただれ・かぶれに伴うかゆみを抑えます。
酸化亜鉛 100.0mg	皮膚表面を乾燥させ、治りを早めます。
グリチルレチン酸 1.0mg	あせも・ただれ・かぶれを起こしている皮膚の炎症をしずめます。

〔添加物〕セタノール、ステアリン酸、流動パラフィン、ミリスチン酸オクチルドデシル、ヒドロキシエチルセルロース、タルク、ステアリン酸ポリオキシル、ポリソルベート20、オレイン酸ソルビタン、セチル硫酸Na、パラベン、クロロヘキシジン塩酸塩、クエン酸、香料

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないこと。



本製品に関するお問い合わせは  
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。  
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造 興和株式会社  
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

