

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



鎮痒消炎薬

# スラジン®-軟膏

じんましん・かゆみに

スラジン-軟膏は…

- じんましん・かゆみにすぐれた効きめをあらわします。
- 患部がかさかさしているときでも、ジュクジュクしているときでも使える、保護力の強い油脂性基剤を使用しています。
- のびがよいので広範囲に塗りやすく、香りのよい白色の軟膏です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



〔効 能〕

じんましん、かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、虫さされ、しもやけ

〔用法・用量〕

1日2～3回、患部に適量を塗布します。

★裏面につづく



## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

## 〔成分・分量と働き〕

成分	分量	働き
ジフェンヒドラミン	1%	アレルギー性の炎症を抑え、じんましんやかぶれなどにすぐれた効果をあらわします。
<i>d</i> -メチルエフェドリン	0.5%	
テシットデシチン	5%	局所麻酔作用により、じんましんなどのかゆみをとりのぞきます。
酸化亜鉛	5%	じんましんやかぶれの時の分泌物を吸収し、患部の治りを早めます。

添加物として、パラベン、ゲル化炭化水素、香料(フェニルエチルアルコール、ベンジルアルコールを含む)を含有します。

## ◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



## ◎早くよくなっていたいただくためのアドバイス

1. **食べ物**(卵・魚など)でじんましんが起きた時は、その食べ物はとらないようにしましょう。日頃からバランスのとれた食事に心がけ、強い香辛料をさげ、消化のよい食べ物を取りましょう。
2. **患部**はかかないようにしましょう。かくと化膿などを起こし、悪化するおそれがあります。
3. **入浴**はぬるめのお湯にしましょう。熱いお風呂に入るとかゆみが強くなる場合があります。
4. **便通**を整えましょう。原因となった食べ物などを早く排出させるために大切なことです。また、下痢などの胃腸障害もじんましんをひき起こすことがありますので胃腸をこわさないように注意しましょう。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの  
お店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号