

かゆみ・虫さされ じんましんに

カアムKクリームS 第2類医薬品
ジフェンヒドラミン・グリチルレチン酸配合 20g



⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【成分・分量】 100g中

ジフェンヒドラミン ……1g dl-カンフル ……2g
リドカイン ……2g l-メントール ……3g
グリチルレチン酸 ……1g

添加物：ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、グリセリン脂肪酸エステル、セタノール、ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー

ご使用の際には、この説明文書をよくお読み下さい。

【効能】

かゆみ、虫さされ、じんましん、湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、しもやけ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないで下さい。

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法を厳守して下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。(4) 外用にのみ使用して下さい。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

発売元 **小林薬品工業株式会社**

東京都中央区日本橋箱崎町40番6号
お客様相談室 電話 058-278-3933
受付時間10時から16時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **高市製薬株式会社**

奈良県高市郡明日香村野口10