

# 貼る かゆみ止めヘルムパッチ

第2類医薬品



使用に際してこの説明書をよく読むこと。また、必要ときに読めるよう大切に保管すること。

## かゆみ止めヘルムパッチ

第2類医薬品

【特徴】かゆみ止めヘルムパッチは、かゆいところにべタンと貼るだけで、かゆみをおさえるパッチです。かき傷も防げます。

### ⚠️ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと  
 (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ **相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感、色素沈着

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- 【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ  
 【用法・用量】パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付する。  
 <用法・用量に関連する注意>  
 (1) 用法・用量を厳守すること。  
 (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。  
 (3) 外用にのみ使用すること。  
 (4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用すること。  
 (5) 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。

【成分・分量】膏体100g(1m<sup>2</sup>)中  
 クロタミトン……5.0g リドカイン………2.0g  
 ジフェンヒドラミン…1.0g イソプロピルメチルフェノール…1.0g  
 添加物として、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイシスポリイソブレンゴム、BHTを含む。

- 【保管及び取扱い上の注意】  
 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。  
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。  
 (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管すること。  
 (誤用の原因になったり品質が変わる。)  
 (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】80枚入(20枚×4袋)(直径3cmの円形)

<お問い合わせ先>  
 本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
**帝國製薬株式会社 お客様相談室**  
 電話 (0879) 25-2363  
 受付時間 9:00~17:00  
 (土・日・祝日を除く)

販売名 かゆみ止めヘルムパッチ

ここを押して  
開けて下さい



副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

帝國製薬株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地