

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

経皮吸収型鎮痛消炎剤 第2類医薬品

カアムパップDX0.5 10枚入
(5枚×2)

1枚14cm×10cm

インドメタシン0.5%配合

使用上の注意

してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〉

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【特徴】

1. インドメタシンを配合しており、痛みの原因物質（プロスタグランジンなど）の生成を抑え、筋肉痛、関節痛、肘の痛みなどに効果をあらわします。
2. 関節などの屈曲部位にもよくフィットする伸縮自在の不織布を使用しています。

【効能・効果】

筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、打撲、捻挫、肘の痛み（テニス肘等）、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】

15歳以上	プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。
15歳未満	使用しないでください。

〈使用方法〉

- 膏体表面の透明フィルムをはがして患部にお貼りください。
- フィルムは親指とひとさし指で膏体をずらすようにすると簡単にはがせます。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚14g)

成 分	含 量
インドメタシン	0.5g

添加物として、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、D-ソルビトール、カオリン、酸化チタン、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマー、カルメロースNa、グリセリン、N-メチル-2-ピロリドン、ケイ酸アルミン酸Mg、l-メントールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わってしまうことがあります。)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めるか又は開口部を折りまげて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記まで連絡いただけますようお願い申し上げます。

連絡先 小林薬品工業株式会社 お客様相談室 058-278-3933
受付時間 10時から16時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

<電話> 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発売元:

小林薬品工業株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製造販売元:

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号