切り口

切り口からゆっくり開封してください

開封後は開口部をおりまげて保管してください。

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1.次の人は使用しないでください
- （1）本剤によるアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
- （2）ぜんそくを起こしたことがある人。
- （3）妊婦または妊娠していると思われる人。
- （4）15歳未満の小児。

2.次の部位には使用しないでください
- （1）目の周囲、粘膜等。
- （2）湿疹、かぶれ、傷口。
- （3）みずむし・たむし等または化膿している患部。

3.連続して2週間以上使用しないでください

相談すること

1.次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください
- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）本人または家族がアレルギー体質の人。
- （3）薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください
- （1）使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症　状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

- （2）5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

[効能・効果]

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

[用法・用量]

表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

（1）定められた用法・用量をお守りください。（2）本剤は痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。（3）汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふきとってから使用してください。（4）皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

[成分・分量（膏体100g中）]　1枚7cm×10cm、膏体量1g

フェルビナク……3.5g　ℓ-メントール……3.0g

添加物:BHT、タルク、スチレン・イソプレン・スチレンブロックコポリマー、テルペン樹脂、流動パラフィン

[保管及び取扱い上の注意]

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）（4）品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部をおりまげて保管してください。（5）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

発売元 東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元 東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

〈お問い合わせ先〉
本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。
東光薬品工業株式会社　03-3855-0101

プラ

A

製造番号

使用期限

切り口