

腰痛、筋肉痛、関節痛、ねんざ

ラクール
新インペタン冷感 6枚入

株式会社東光工業 医薬品販売部

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないでください
 - 本剤による過敏症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。
 - 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください
 - 目の周囲、粘膜等。
 - しっしん、かぶれ、傷口。
 - みずむし・たむし等または化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください

⚠ 相談すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関節部位	症状
皮	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

※症状悪化
本剤の使用に痛みをとまらぬ赤味を帯びた米粒大の水疱があらわれた場合には、ウイルスによる痒疹性皮膚炎であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮膚科専門医の診療を受けてください。

製造番号

使用期限

B



4 987435 552914

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読むよう大切に保管してください。

RAKOOL

特徴

- インドメタシン配合で痛みのもとに優れた効果を発揮します!!
- 全方向伸縮タイプで関節部位にもピッタリとフィットします!!
- 微香性なので湿布剤独特の気になるニオイを抑えています!!

販売名 新インペタン

● 成分・分量
 膏体100g中
 インドメタシン.....0.5g
 添剤として、オオリン、酸化チタン、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中化物、カルボキシビニルポリマー、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、エタド酸Na、N-メチル-2-ピロリドン、トイロアルミン酸Mg、ポリオキシエチレン硬化トリス油、イソメントールを含有します。

● 効能・効果
 腰痛、関節痛、肩凝り(手・首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、打撲、ねんざ、傷こりに痒う痒い痛み

● 用法・用量
 プラスチックフィルムをはがし、1日2回を程度として患部に貼ってください。
 (用法・用量に際する注意)

(1)本剤は、痛みやほれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやほれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
 (2)定められた用法・用量をお守りください。
 (3)汗をかいたり、患部がぬれてい場合は、よく拭き取ってから使用してください。
 (4)皮膚の弱い人は、使用前に患部の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

● 保管及び取扱い上の注意
 (1)直射日光の当たらない湿度の少ない涼しい所に保管してください。
 (2)小児の手の届かない所に保管してください。
 (3)他の容器に入れかえないでください。(剤形の異なることなり品質が変わる。)
 (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めるかまたは開口部をおりまげて保管してください。
 (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】

(株) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkou/igai.html>

＜電話＞0120-149-631 (フリーダイヤル)

【お問い合わせ先】

ラクール薬品販売株式会社
フリーダイヤル 0120-85-8998

東光工業
ラクール薬品販売株式会社
東京都立江東区豊洲1丁目9番14号

東光工業
東光薬品工業株式会社
東京都立江東区豊洲2丁目16番23号

