

ご使用に際して、必ずこの説明文書をお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第②類医薬品

鎮痒消炎薬

かゆみ・虫さされ・かぶれ・湿疹

ココラEX

- ◆**ココラEX**は、アンテドラッグステロイド剤「プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)」を主成分とした外用液剤です。アンテドラッグは、患部で優れた効果を発揮したのち、体内に吸収されると低活性物質に変化します。PVAは湿疹や皮膚炎等の炎症をしずめます。
- ◆ジフェンヒドラミン塩酸塩とクロタミトンが虫さされや湿疹等のかゆみを抑えます。
- ◆*l*-メントールと *dl*-カンフルの強い清涼感がかゆみをしずめます。
- ◆イソプロピルメチルフェノールが患部を殺菌します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
(2)創傷面、目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。
3. 長期連用しないで下さい。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4)患部が広範囲の人
(5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

虫さされ、かゆみ、皮膚炎、かぶれ、湿疹、あせも、じんましん

裏面もお読み下さい。

用法・用量

- 1日数回、適量を患部に塗布して下さい。
○塗布部をお肌当てて軽く押し、塗布部に薬液をしみ込ませてから、患部に軽く塗って下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量をお守り下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)外用にのみ使用して下さい。

成分・分量

100mL中

成 分	分 量	は た ら き
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)	0.15 g	抗炎症作用により、はれ、赤みを抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0 g	抗ヒスタミン作用により、かゆみを抑えます。
クロタミトン	5.0 g	湿疹・かぶれ等に伴うかゆみを抑えます。
<i>dl</i> -カンフル	1.0 g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
<i>l</i> -メントール	3.5 g	
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌作用があります。

添加剤:マクロゴール、プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、ジブチルヒドロキシルエン、ハアセチルしょ糖、エタノール 含有

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないで下さい。
- (5)次の物には付着させないで下さい。(変質又は変色する場合があります。)
床や家具等の塗装面、メガネ、時計、アクセサリ類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品等。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。
- (7)使用後はキャップをしっかり締め、容器を立てて、保管して下さい。

〈ご相談窓口〉

お買い求めのお店又は下記窓口まで
東和製薬株式会社
☎ (0736) 64-2567
時間9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

東和製薬株式会社

和歌山県紀の川市貴志川町丸九1229番地