

## 第3類医薬品

使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

# 玉龍アセモールS(外用鎮痒消炎薬)

抗ヒスタミン剤であるジフェンヒドラミンを配合した鎮痒消炎薬で、しかも酸化亜鉛の配合により、患部を収れん、乾燥させて保護します。あせもやかゆみに効果をあらわします。

### 特長

- かゆみや炎症をしずめるジフェンヒドラミン配合
- 患部を乾燥させる酸化亜鉛配合
- 炎症をしずめるグリチルレチン酸配合
- ご家族皆様でお使いいただける、なめらかなクリーム状の軟膏です



### 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

### 効能・効果

湿疹、あせも、ただれ、かゆみ、かぶれ、じんましん、しもやけ、虫さされ、皮膚炎

### 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布またはすりこんで使用してください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (6) 皮膚が敏感な人や乳幼児は、腕の内側などの柔らかいところに少量つけて、異常がないことを確かめてから使用してください。

### 成分・分量 本品100g中

成 分	分 量	は た ら き
ジフェンヒドラミン	1.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみや炎症をしずめます。
酸化亜鉛	20.0g	収れん作用、乾燥作用により患部を保護します。
アミノ安息香酸エチル	1.0g	局所麻酔作用により、かゆみをしずめます。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	0.5g	血行促進作用により、炎症の改善を助けます。
グリチルレチン酸	0.2g	炎症をしずめます。

添加物：ゴマ油、トウモロコシデンプン、ゲル化炭化水素、ハッカ油、プロピレングリコール、無水ケイ酸、ポリソルベート80

### 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### 〈お問い合わせ先〉

本品に関してのお問い合わせは、  
お買い求め先または下記までご連絡ください。

常盤薬品工業株式会社  
お客さま相談室 ☎0120-875-710まで  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)  
[www.tokiwayakuhin.co.jp](http://www.tokiwayakuhin.co.jp)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎0120-149-931

製造販売元  
常盤薬品工業株式会社  
大阪府中央区安土町3-5-12  
NOEVIR GROUP