

この説明文書は、使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように保存してください。

第2類医薬品
皮膚病薬



湿潤性しっしん、かぶれ、あせも、かゆみ止めに



〔使用上の注意〕 ⚠

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 深い傷やひどいやけどの人
- 使用后、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

〔効能又は効果〕

しっしん・あせも・かぶれ・かゆみ止め・湿潤性しっしん・かいせん

〔用法及び用量〕

そのまま患部に撒布する

〔用法及び用量に関連する注意〕

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

〔成分及び分量〕

(100g中)

イオウ……………1.5.2 g アクリノール水和物……………0.2 g フェノール……………0.3 g
酸化亜鉛……………3.7.5 g d-カンフル……………1.5 g 安息香酸……………0.8 g
添加物としてタルク、カオリン及びバレイシヨデンブンを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 本剤は、長期間静置しますとまれに固まる場合がありますが、振るとサラッとした状態に戻り品質には影響ございません。固まっている場合は、赤い外蓋の部分を押さえ、上下左右に振ってからご使用下さい。
- 本剤は原料により色が幾分変わる場合がありますが、品質には変わりありません。また、本剤が衣服に付着すると黄色くなり、落ちにくくなる場合がありますのでご注意ください。

お問い合わせ先

寧薬化学工業株式会社
電 話 0745-22-4151
受付時間 9:00～16:00(土・日・祝日を除く)