

肩・腰・関節痛に

外用鎮痛消炎薬

アクテオン[®] 1.0% ゲルクリーム

販売名：アクテオン1.0%ゲルクリーム

特 長

アクテオン1.0%ゲルクリームは

●筋肉や関節の痛みをとります

有効成分インドメタシンが皮ふから吸収され、痛みや炎症のもとに直接作用します。

●心地よい清涼感が持続します

有効成分ℓ-メントールが3%配合され、スーツとした清涼感で痛みをやわらげます。

●使用感に優れています

サーツと良くのび、べたつかないゲルクリームです。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。
- (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4)薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用后、次の症状があらわれた場合。


| 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 |

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効 能

腰痛、関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、ひじの痛み(テニスひじなど)、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)

こんな時にお使いください



用法・用量

1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)11才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)11才未満の小児には使用させないでください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (6)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。

成分とそのはたらき

有効成分(100g中)

| 成分 | 分量 | はたらき |
|---------|--------|-------------------|
| インドメタシン | 1000mg | 痛みやはれを抑えます。 |
| ℓ-メントール | 3000mg | 清涼感を与え、痛みをやわらげます。 |

添加物としてラウリン酸マクロゴール、チオ硫酸Na、エデト酸Na、ジイソプロパノールアミン、パラベン、ベンジルアルコール、カルボキシビニルポリマー、オクチルドデカノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(ケース及びチューブに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。
使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。
- (5)衣類や寝具などに付着し汚れた場合には、なるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)

製造販売元



株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

®登録商標

SS06