

クールで
すつきり かゆみ止め



アンテドラック型抗炎症成分

PVA 配合

携帯に便利なミニサイズ

20mL

かゆみ
虫ささされに

鎮痒消炎剤

イングラム®

第②類医薬品

かゆみ、虫さされに

PVA

(プレドニゾン吉草酸エステル
酢酸エステル)配合

鎮痒消炎剤

【販売名】イングラム® EX液 第②類医薬品

ご使用前に、必ずこの説明文書をお読み下さい。また、必要な時にすぐ読めるように大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。(2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。2. 長期連用しないこと 3. 本剤はステロイド成分を含んでおり、顔面に広範囲・長時間(目安として2週間以上)塗布すると赤ら顔のようになることがあるので、顔面に続けて長く使用しないこと

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。(5) 湿潤やただれのひどい人。2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること (1) 使用後、次の症状が現れた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

虫さされ、かゆみ、しっしん、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布する

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3) 外用にのみ使用すること。

【成分・分量】(1mL中)

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル
…1.5mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩…10mg、
L-メントール…35mg、dl-カンフル…10mg、
イソプロピルメチルフェノール…1mg

【添加物】ラウロマクロゴール、プロピ
レングリコール、ヒドロキシプロピル
セルロース、エタノール

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かないところに保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4) 火気に近づけないこと。(5) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。(6) 使用期限(容器底面に記載)の過ぎた製品は使用しないこと。(7) 本剤は、メガネ、化粧品の服、プラスチック類、皮製品等に触れると変質させることがあるので付着しないよう注意すること。

製造販売元 前田薬品工業株式会社
富山県富山市向新庄町1-18-47

お客様相談室 076-451-3731

副作用被害救済制度 0120-149-931



透明シート: PET、
キャップ: PP、
中栓: PE、ボトル: PP



4 987530 721147