

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要なときに読めるよう、大切に保管して下さい。

筋肉・腰・関節の痛みに

マイコーチアルギークリーム

インドメタシン製剤

マイコーチアルギークリームは、非ステロイド系抗炎症薬インドメタシンを主成分とした、消炎鎮痛外用薬で、インドメタシンを直接患部に浸透させることにより、筋肉痛、腰痛、関節痛をはじめ、打撲、捻挫などの痛みをやわらげる作用に大変優れております。

本品は、サラッとしたクリーム剤でいやなべつつき感が少なく、有効成分のインドメタシンが患部にスムーズに浸透し易く、清涼感にも独自の工夫をこらしております。

《製品特徴》

- (1) 有効成分のインドメタシンが、痛み、炎症の原因となる物質（プロスタグランジン）の発生を抑制します。
- (2) べつつき感が少なく、浸透性に大変優れたのびのよいクリーム剤です。
- (3) 臭いがなく、衣服を汚さないさわやかな塗り心地です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないこと
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

《効能又は効果》

筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫。

《用法及び用量》

1日4回を限度として適量を患部に塗擦して下さい。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 11歳以上の小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 11歳未満の小児には使用させないでください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用のみに使用し、内服しないでください。
- (5) 1週間あたり、50gを超えて使用しないでください。

《成分及び分量》 本品 100g中

インドメタシン……………750mg

（添加物として、 θ -メントール、セタノール、プロピレングリコール、ミスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、パラフィン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、パラベンを含有する）

《保管及び取扱上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても開封後は、品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒 6 3 4 - 0 8 1 5 奈良県橿原市大谷町182番地 TEL 0744-22-2440
株式会社雪の元本店 消費者相談窓口 FAX 0744-22-2406

製造元



株式会社 雪の元 本店

奈良県橿原市大谷町182番地