

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

筋肉痛・肩こり・腰痛に

# タイガーバームスティックN

天然生薬成分・外用消炎鎮痛剤

タイガーバームスティックNはシンガポール虎豹兄弟国際有限会社で開発され、100年以上にもわたりアジアを中心に世界70余国で愛用されている外用消炎鎮痛剤タイガーバームをスティックタイプにしたものです。

スティックタイプなので、手を汚さず、患部に塗ると天然生薬の成分が皮膚からすみやかに吸収されて、血行を促進し、筋肉の疲れ、痛み、肩のこりなどに効果をあらわします。ベトつかずサラッとした使用感と清涼感が特長です。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

#### 1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】


腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

## 【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布又は塗擦してください。

### <使い方>

- (1) 図のように容器の底部を回し、薬剤を3～4mm出して使用してください。
- (2) キャップを閉めるときは、薬剤を容器内にもどしてください。



### <用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を3～4mm出してから使用してください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

- (4) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用のみに使用してください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、少量を塗り半日以上たって発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7) 薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

### 【成分・分量】(100g中)

成分	含量
d-カンフル	24.9g
ハッカ油	15.9g
ユーカリ油	12.9g
ℓ-メントール	8.0g
チョウジ油	1.5g

添加物：ステアリン酸Na、グリセリン、プロピレングリコール、  
ハアセチルしょ糖、エタノール、ステアリン酸グリセリン

### 【保管および取扱い上の注意】

- (1) 本品を火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (3) 車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。
- (4) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (5) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）。
- (6) 揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。
- (7) 合成樹脂、塗料（家具、塗装床、アクセサリー等）、化繊、絹、皮革等に付着すると変色又は変質する場合がありますのでご注意ください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

#### お問い合わせ先

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い上げのお店又は、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。



株式会社 **龍角散** お客様相談室

東京都千代田区東神田2-5-12

電話 03-3866-1326 時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

✕ 毛 購入店など記入してください。



株式会社 **龍角散**

千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460番地3  
本社所在地：東京都千代田区東神田2-5-12