

第2類医薬品

鎮痛消炎薬

この説明書は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。

肩こりの痛み・腰痛・筋肉痛・関節痛に


# インサイドPXクリーム

痛みのもとに直接作用 ピロキシカム含有製剤

INSIDE PX CREAM

■ インサイドPXクリームは……

- すぐれた製剤技術の応用により、肩や腰、関節などの体の内側の痛いところ（インサイド）まで、ジワ〜ッと鎮痛成分が浸透していくよう設計された鎮痛消炎剤です。
- ジワ〜ッと浸透したインサイドの鎮痛成分が、痛みのもとといわれるプロスタグランジンに直接作用して痛みをとっていくため、肩の重くてつらい鈍痛にも、腰のうずくような痛みにも、関節の刺すような痛みにも効果があります。
- なめらかでソフトな塗り心地。しかも微香性なのでニオイも気になりません。



## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

#### 1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4)15才未満の小児。

#### 2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。
- (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。

#### 3. 長期連用しないでください

### 👤 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(裏面につづく)

®：登録商標

## 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状   |
|------|---|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、落屑（皮膚片の細かい脱落）、光線過敏症（日光が当たった部位に起こる発疹や水ぶくれ等の炎症） |

(2) 1～2週間使用しても症状がよくなる場合。

### ■ 効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、肘の痛み（テニス肘など）、腱鞘炎（手・手首の痛み）、打撲、捻挫

### ■ 用法・用量

1日3～4回適量を患部に塗擦します。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (2) 外用にのみ使用してください。
- (3) 本剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (4) 1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (5) 使用後は手を洗ってください。

### ■ 成 分 1g中

ピロキシカム ……………5mg  
添加物として、セトマクロゴール、セトステアリルアルコール、プロピレングリコール、ステアリン酸マクロゴール、クエン酸、クエン酸Na、パラベンを含有します。

### ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (5) 衣服などに薬剤の色が付着することがあるので、塗擦後はよく乾かしてください。
- (6) アルコールなどで変質するおそれのあるもの（化学繊維、メガネ、塗装面など）には付着しないよう注意してください。
- (7) 使用期限をすぎたものは使用しないでください。

### ■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室  
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>