

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

虫さされ・かゆみに

ヒブールEXゲル

第②類医薬品

主成分のプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは、アンテドラッグといわれる種類のステロイド剤です。アンテドラッグとは、皮膚表面の患部で効果を示し、体内に吸収されると低活性となる薬剤のことです。しっしん、じんましん等の炎症をしずめるプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルに、かゆみを抑えるジフェンヒドรามイン塩酸塩、クロタミトンを配合しています。イソプロピルメチルフェノールは、殺菌効果があります。l-メントール、dl-カンフルは、清涼感を与えかゆみをしずめます。本剤は、べたつかない透明なゲルクリームです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
(2)創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)患部が広範囲の人。
(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

虫さされ、かゆみ、しっしん、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも


【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

（用法・用量に関連する注意）

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。


●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出してください。
(①→②)



●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。

折り曲げないでください。

折りたたまないでください。



【成分・分量】 100g中に次の成分を含みます。

成分	分量	働 き
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイド剤 PVA)	0.15 g	しっしん、じんましん等の炎症をしずめます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0 g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
l-メントール	3.5 g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dL-カンフル	1.0 g	
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌効果があります。
クロタミトン	5.0 g	かゆみを抑えます。

添加物として、1,3-ブチレングリコール、ヒプロメロース、ヒドロキシエチルセルロース、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、エタノールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (6)メガネ、時計、アクセサリ、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (7)使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

製品のお問い合わせ先
小林薬品工業株式会社お客様相談室
電話 058-278-3933
受付時間 10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元

小林薬品工業株式会社
東京都中央区日本橋筋崎町40番6号

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱1169-142