

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封したあとはなるべく早く使用すること。

【ご注意】

カンジダ症、トリコモナス症などの原因によるかゆみは、医師による根本治療が必要です。

製造販売元 万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五桂1169-142

日本製  
内容量：30g

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願い致します。  
万協製薬株式会社 「お客様相談室」 電話 0598-30-5376  
受付時間 10:00～17:00(ただし、土、日、祝日は除きます。)

C2509

第2類医薬品

デリケートな部分のかゆみ・かぶれに  
エプールVZクリーム



デリケートな部分のかゆみ・かぶれに  
エプールVZクリーム

セルフレメディケーション  
税 控除 対象

かゆみ止め成分  
殺菌成分配合

非ステロイド剤 第2類医薬品 30g



M004  
1



販売名：エプールVZ(鎮痒消炎薬)

【成分・分量】(100g中)

ジフェントドラミン塩酸塩…2.0g、グリチルレチン酸…1.0g、イン  
プロビルメチルフェニール…0.5g、リドカイン…2.0g、トコフェ  
ロール酢酸エステル…2.0g

添加物として、プロピルヘンチオール、モノステアリン酸グリセリン、ステアリルアルコール、セタール、セ(シ)ン/慶ジエチル、ポリリキシエチン硬化ヒマシ油、ポリソルベート6  
0、カルボキチニールポリマー、パラベン、2,2',2"-ニトリロリエタノールを含有します。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布する。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けること。(4) 外用にのみ使用すること。(5) 同じ部位に他の外用剤との併用は避けること。



(上段は使用期限、下段は製造番号です)

第2類  
医薬品

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

△ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副作用報告熱線制度 ☎0120-149-931