

虫さされ・かゆみに

サリベートPCジェル

鎮痒消炎剤

第2類医薬品

【特 徴】

- プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは、「アンテドラッグ」のステロイド剤で、湿疹や皮膚炎等の炎症を鎮めます。

「アンテドラッグ」とは？……皮膚表面の患部ですぐれた抗炎症作用を発揮したのち、体内に吸収されると低活性となる性質を持つ薬剤の総称です。そのためステロイド特有の副作用を起こしにくい特性をもっています。

- 抗ヒスタミン剤であるジフェンヒドラミン塩酸塩と鎮痒剤クロタミトンが虫さされや湿疹等に伴うかゆみを抑えます。
- *l*-メントールと*dl*-カンフルのスイートとする清涼感がかゆみをすばやく鎮めます。
- 殺菌剤イソプロピルメチルフェノールが患部の雑菌の繁殖を抑えます。



使用上の注意



してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〉

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2) 目の周囲、粘膜等
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

虫さされ、かゆみ、皮ふ炎、かぶれ、湿疹、あせも、じんましん



【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。


＜用法・用量に関連する注意＞

1. 定められた用法・用量をお守りください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4. 患部を掻かないでください。本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみる場合があります。
5. 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

※擦り込むように塗ると、ジェルが固まり肌から剥がれることがありますので、薄くのばし肌のにせるように塗布してください。

また、本剤の特性上、塗布したジェルが透明な膜状となることがありますが、配合されている原料由来のもので、薬剤の有効性、安全性には影響ございません。

＜チューブの穴の開け方＞



キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

【成分・分量】

成分	含量 (100g中)	はたらき
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.15g	湿疹・皮ふ炎等のはれ・赤みを抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、虫さされ等に伴うかゆみや炎症を抑えます。
クロタミトン	5.0g	湿疹、虫さされ等に伴うかゆみを抑えます。
dl-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみをすばやく鎮めます。
l-メントール	3.5g	
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	患部の雑菌の繁殖を抑え、症状の悪化を防ぎます。

添加物として、1,3-ブチレングリコール、ヒプロメロース、ヒドロキシエチルセルロース、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、クエン酸水和物、エタノールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
4. 時計、めがね等の金属類、プラスチック類、化学繊維類、皮革製品、塗装のしてある床・家具類に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
5. 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
7. 火気に近づけないでください。

製品についてのお問い合わせ

- お買い求めの販売店
- ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
(受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9：00～17：00）

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168