

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

しっしん・かゆみ・じんましんに ダイヤゾンG軟膏

非ステロイド剤

【特 長】

- ◆炎症をしずめる……グリチルレチン酸・ジフェンヒドラミンが、炎症(皮膚の赤み、はれ、ほてり等の症状)をしずめ、湿疹・かぶれ・じんましん・かゆみをおさえます。
- ◆痛み・かゆみを止める……ジフェンヒドラミン(抗ヒスタミン剤)・ジブカイン(局所麻酔剤)が、炎症にともなう痛み、かゆみをおさえます。
- ◆殺菌・消毒する……イソプロピルメチルフェノールの強力な殺菌消毒作用が、バイ菌におかされやすくなった患部を感染から守ります。
- ◆患部の治りを早める……患部になじみ、違和感のない、クリームタイプです。さらに、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE剤)は皮膚から吸収され、血行をよくします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の方は使用の前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1)医師の治療を受けている方
 - (2)本人又は家族がアレルギー体質の方
 - (3)今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある方
 - (4)湿潤やただれのひどい方
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1)使用后、発疹・発赤、かゆみ、はれ等の症状があらわれた場合
 - (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

湿疹、かゆみ、じんましん、皮膚炎、ただれ、かぶれ、あせも、しもやけ、虫さされ



【用法・用量】

1日数回、患部に適量を塗布してください。

◆用法・用量に関連する注意

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないようご注意ください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量(100g中)】

ジフェンヒドラミン…………… 1.0g・ジブカイン…………… 0.1g
グリチルレチン酸…………… 1.0g・トコフェロール酢酸エステル… 0.5g
イソプロピルメチルフェノール…………… 1.0g

添加物として、ラウロマクロゴール、ワセリン、ステアリン酸、セタノール、プロピレングリコール、マクロゴール、ステアリン酸マクロゴール、スクワラン、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸グリセリン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ラウリル硫酸Naを含有します。

◆保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限(外箱記載)をすぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

ミヤリサン製薬株式会社 お客様相談室

住所：東京都北区上中里1丁目10番3号

電話：(03) 3917-1191

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元  **ミヤリサン**

ミヤリサン製薬株式会社

東京都北区上中里1丁目10番3号

製造販売元 **新生薬品株式会社**

富山県中新川郡上市町森元町7-2