

TOKUHON V DASH

外用消炎鎮痛エアゾール剤

特長

炎症を抑え痛みをやわらげるサリチル酸グリコール、血行を改善するビタミンE等の配合により、打撲・捻挫・筋肉疲労等にすぐれた効果を発揮
ほてった患部を瞬間冷却
毛生部や関節部にも手軽にスプレー

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

- 次の部位には使用しないこと
 - 目の周囲、粘膜等
 - 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- 次の場合は直ちに使用を中止し、説明文書をもって医師又は薬剤師に相談すること
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み

- 5～6日間使用しても症状の改善が認められない場合

【効能又は効果】 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法及び用量】 適量を1日数回患部に噴霧して下さい。

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ、7歳未満の人には使用しないで下さい。
- 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けて下さい。
- 大量・広範囲には使用しないで下さい。
- 凍傷のおそれがあるため、患部から10cm以上離して噴霧するほか、同じ所に3秒以上連続して噴霧しないで下さい。
- 外用にのみ使用し、吸入しないで下さい。吸入によりめまい、はき気等の症状をおこすことがあるので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して下さい。
- パウダー入りですので、よく振ってから使用して下さい。


【成分及び分量】 有効成分 100mL中

成 分	分 量	はたらき
ℓ-メントール	1.27 g	知覚神経を軽くマヒさせる
サリチル酸グリコール	0.9 g	炎症を抑え痛みをやわらげる
ビタミンE酢酸エステル	0.18 g	血行をよくする
グリチルレチン酸	36.2mg	皮膚の炎症を抑える
ジフェニルイミダゾール	36.2mg	皮膚の炎症を抑える
ニコチン酸ベンジルエステル	3.6mg	血行をよくする

添加物としてアルコール、タルク、八アセチルしょ糖、メチルフェニルポリシロキサン、ジメチルエーテル、液化石油ガスを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光をさげ、キャップを閉めて涼しい所に保管して下さい。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- 使用後は、必ず下記の方法で残りのガスを抜いて下さい。




【ガス抜きの注意事項と方法】


必ず中身を使い切ってから、火気のない屋外で行ってください。
ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないで下さい。
本品のキャップ以外使用しないで下さい。

押しボタンを引き抜きます。

キャップの上部をはずし、
平らな所に伏せて置きます。



キャップの天面中央の穴に
本体を逆さまにして押し込み、
噴射音が消えるまで放置します。



噴射音が完全に消えてから、
市町村等で定められた方法
により廃棄して下さい。

残ガス排出機構付き

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

1. 炎や火気の近くで使用しないこと。
2. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3. 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4. 火の中に入れてないこと。
5. 使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG,DME

100mL 第一石油類 18.1mL 火気厳禁

200mL 第一石油類 36.2mL 火気厳禁

【内容量】 100mL・200mL

【お客様相談室】 ☎ 0120-687-355(受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
/ 土・日・祝日は除く)

製造販売元  株式会社 トクホン 〒105-0014 東京都港区芝2-28-8