

のび～る

第3類医薬品

バナバップ-A



【特長】

- バナバップ-Aは、鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわせもった冷感バップ剤です。
- バナバップ-Aは、炎症や痛みにも効果のある5つの有効成分(サリチル酸グリコール、サリチル酸メチル、ハッカ油、dl-カンフル、ジフェンヒドラミン塩酸塩)が皮ふから吸収されて、効きめを発揮します。
- バナバップ-Aは、粘着力のある弱酸性基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】 打撲、捻挫、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、肩こり、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (4) 皮ふの弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。
(使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

【成分・分量】 本品膏体100g(1000cm²)中

サリチル酸グリコール …… 1.0g サリチル酸メチル …… 1.0g
 ハッカ油 …… 1.0g dl-カンフル …… 1.0g
 ジフェンヒドラミン塩酸塩 …… 0.02g
 添加物として、カオリン、ゼラチン、ポリアクリル酸Na、CMC-Na、グリセリン、D-ソルビトール、ポリソルベート80、尿素、エドト酸Na、pH調整剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【販売名】 バナバップ-A

【包装】 30枚入 [6枚入×5袋] (1枚:14cm×10cm)

<お問い合わせ先>

帝國製薬株式会社 お客様相談室
 電話 (0879)25-2363
 受付時間 9:00～17:00
 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931

帝國製薬株式会社
 香川県東かがわ市三本松567番地