

第2類医薬品

この説明書は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。

水虫・たむし治療剤

抗白癬菌剤エキサラミド・鎮痒剤クロタミトン配合

ソルジャーエース液

SOLDIER ACE SOLUTION

みずむし・たむしはかゆくて不快なものですが、これは白癬菌^{はくせんきん}というカビの一種が皮膚表面の角質層に寄生して起こります。

ソルジャーエース液は、当社が研究・開発した抗白癬菌剤エキサラミドに、角質層を軟化させ薬剤の浸透性をたかめるサリチル酸、不快なかゆみをしずめるクロタミトンを配合したみずむし・たむし治療剤です。

作用と特長

抗白癬菌力がすぐれています

抗白癬菌剤エキサラミドは、みずむし・たむしの原因である白癬菌に対して広い抗菌スペクトルを有し、すぐれた抗白癬菌力をあらわします。

角質層によく浸透します

白癬菌の寄生している角質層は、薬剤が浸透しにくい部位であるため、とかく治療を困難にします。ソルジャーエース液は、角質層への薬剤浸透性をよくするサリチル酸を配合し、みずむし・たむしの治療効果をたかめています。

不快なかゆみをしずめます

すぐれた鎮痒作用を有するクロタミトンの働きにより、みずむし・たむしにつきものの不快なかゆみをしずめます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)乳幼児。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)患部が顔面又は広範囲の人。
- (6)患部が化膿している人。
- (7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、ただれ

- (2)2週間位使用しても症状がよくなる場合。

■ 効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

■ 用法・用量

1日2～3回、適量を患部に塗布します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。


☆使用前には、図1のように容器を上に向けて、先端を手の指などで1～2度空押しして、中の空気を抜いてください。気温や手の体温などで容器が温まった場合や内容液が少なくなった場合などに、容器内の圧力がたかまり、液が多くでることがあるので、これを防ぐためです。

☆図2のように容器の先端を患部に軽く押しあてて塗布してください。プッシュ式ですから容器をさかさまにただけでは、薬液はでないようになっています。

使用前



使用中



■ 成 分 1mL中

エキサラミド	50mg
サリチル酸	20mg
クロタミトン	50mg

添加物として、ラウロマクロゴール、アルコール、エデト酸4Na、BHT、リン酸を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。ただし、冷蔵庫など低温の場所には保管しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (6)アルコールなどで変質するおそれのあるもの(化学繊維、メガネ、塗装面など)には付着しないよう注意してください。
- (7)使用期限をすぎたものは使用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>