

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

みずむし・たむし用薬

第②類医薬品

# アフテイトクリームWT

## 特長

水虫・たむしは、皮膚表面の角質層に白癬菌というカビ(真菌)の一種が侵入して起こる皮膚病で、かゆみが殆どなく乾燥したものから、かゆみが強くジュクジュクしたものまで様々な病型がありますが、原因菌である白癬菌が、薬物の浸透し難い角質層の奥に潜んでいるため根治が難しい疾患です。本剤は、角質層に長時間留まって効果が持続する殺真菌成分テルビナフィン塩酸塩(塩酸テルビナフィン)に加えて、かゆみを止めるための3つの成分、クロタミトン、グリチルレチン酸、l-メントールを配合し、1日1回の使用で効果をあらわす、多忙な現代人の生活にピッタリの水虫・たむし治療薬です。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。  
テルビナフィン製剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。
  - (2)湿疹。
  - (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠している可能性のある人。
  - (3)乳幼児。
  - (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6)患部が顔面又は広範囲の人。
  - (7)患部が化膿している人。
  - (8)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
  - (1)使用后、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状   |
|------|---|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かぶれ、かゆみ、はれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ)、アカのような皮ふのはがれ、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮ふの亀裂 |

- (2)2週間位使用しても症状が良くならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合。

## [効能・効果]

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

## [用法・用量]

1日1回、適量を患部に塗布してください。

### 用法・用量に関連する注意

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないようにご注意ください。万一入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

## [成分・分量]

| 成分                        | 分量(1g中) | 作用                              |
|---------------------------|---------|---------------------------------|
| テルビナフィン塩酸塩<br>(塩酸テルビナフィン) | 10mg    | みずむし・たむしの原因菌である白癬菌を殺菌します。       |
| クロタミトン                    | 50mg    | 特異的にかゆみを抑えます。                   |
| グリチルレチン酸                  | 5mg     | 非ステロイド性の抗炎症作用によりかゆみ等の炎症症状を抑えます。 |
| l-メントール                   | 20mg    | 患部に冷感を与えかゆみを軽減します。              |

添加物：ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、BHT、エデト酸Na、ジイソプロパノールアミン、水酸化Na、塩酸

## [保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になりたり品質が変わります。)
- (4)使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後はなるべく速やかにご使用ください。
- (5)本剤の成分である油脂類などで変質・変色のおそれのあるもの(化学繊維、合成樹脂、家具、床等)への付着は避けてください。



### 水虫治療のポイント

1. 清潔 患部も衣類(靴下)もこまめに洗い清潔に。
2. 乾燥 靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通し良くよく乾燥。
3. 根気 お風呂上りの薬剤治療、かゆみが消えても、もう1ヶ月。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までお願いいたします。

[受付時間9:00~17:00(土、日及び祝日は除く)]

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号076-472-0361

〒930-0344 富山県中新川郡上市町森元町7-2

発売元 **小林薬品工業株式会社**  
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製造販売元 **新生薬品株式会社**  
富山県中新川郡上市町森元町7-2