

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

たむし・水虫

第2類医薬品

エスベルマ A

■みずむし・たむし用薬 ■販売名：エスベルマ A

たむし・水虫は、カビ（真菌）の一種である白癬菌が皮膚表面の角質層に寄生することによって起こる皮膚病です。

「エスベルマ A」はウンデシレン酸により皮膚表面の pH（ペーハー）を酸性にして白癬菌が繁殖できない環境を作り、アミノ安息香酸エチル、ジフェンヒドラミン塩酸塩によりかゆみ・痛みを抑え、グリチルレチン酸が皮膚の炎症を抑えます。それに加え、かきこわしてしまった患部の肉芽増殖を促進して創傷を治癒するリトスペール（シコン抽出油）、二次感染を防止するクオールヘキシジン塩酸塩によりたむし・水虫を治します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は使用しないでください

- （1）目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、陰等）、陰のう、外陰部等。
- （2）湿疹。
- （3）湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）乳幼児。
- （3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （4）患部が顔面または広範囲の人。
- （5）患部が化膿している人。
- （6）「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

いんきんたむし、ぜにたむし、水虫

■ 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

■ 成分・分量 (100g中)

成 分	分 量	は た ら き
ウンデシレン酸	10 g	抗真菌作用があります。
アミノ安息香酸エチル	1 g	患部の痛み・かゆみを抑えます。
ジフェニヒドラミン塩酸塩	0.5 g	かゆみを抑えます。
リトスベール (シコン換算量として)	15 g (1.67 g)	生薬「紫根(シコン)」の抽出油で、組織再生肉芽形成作用があります。
グリチルレチン酸	0.5 g	生薬「甘草(カンゾウ)」の由来成分で炎症を抑えます。
クロルヘキシジン塩酸塩	0.5 g	殺菌作用があります。

※添加物としてダイズ油、マクロゴール、ニューコクシン、香料を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 軟膏が冷たくなりすぎるとチューブから出なくなる場合があります。その場合には、暖かい場所に移してしばらくしてから使用してください。
- (5) 本剤は日時の経過とともに色調の変化が幾分見られますが、有効成分の効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。

合名会社 東宝製薬 電話 058-251-6668 (代表)
受付時間 10:00~16:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 合名会社 東宝製薬
岐阜市沖ノ橋町3丁目4番地