

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

みずむし・たむし用薬 バーストンクリームW

第②類医薬品

水虫・たむしは、白癬菌というカビが皮ふの角質層等に寄生して起こる皮膚病で、かゆみや痛みを伴うことが多くあります。

バーストンクリームWは、テルビナフィン塩酸塩の優れたはたらきにより角質層によく浸透して白癬菌を殺菌し、リドカイン配合により気になる水虫のかゆみを和らげ、水虫・たむしによる不快な症状を改善します。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。

(2)湿疹。

(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)乳幼児。

(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6)患部が顔面又は広範囲の人。

(7)患部が化膿している人。

(8)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 次の場合は、ただちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮ふのはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮ふの亀裂

(2)2週間位使用しても症状がよくなりえない場合、又は、本剤の使用により症状が悪化した場合

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

（用法・用量に関連する注意）

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、ただちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。

【成分・分量】

100g中

テルピナフィン塩酸塩 1.0g

リドカイン 2.0g

※添加物：ポリソルベート60、ジブチルヒドロキシトルエン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ステアリルアルコール、セタノール、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ジプロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Na

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。
(品質保持のため)
- (5)チューブの口に穴を開ける際にチューブを強く握り過ぎるとクリームが多く出る場合がありますのでご注意ください。

水虫治療のポイント

- 患部はいつも清潔にしましょう。靴下や靴等も清潔なものを使用しましょう。
- 白癬菌の寄生は、症状のあらわれている範囲より広がっていることが多いため、薬剤は広めに塗布しましょう。
- かゆみ等がなくなっても、再発することがあるためしばらくの間は根気よく治療を続けましょう。
- 患部のむれを防ぎ、乾燥に心がけましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。
小林薬品工業株式会社 お客様相談室 電話058(278)3933
受付時間 10時から16時まで（土、日、祝日を除く）

発売元

株式会社 **CFSコーポレーション**
横浜市港北区新横浜2丁目3番19号

企画・開発

小林薬品工業株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142