

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。
必要時に読めるように大切に保管すること。

第2類医薬品

真菌性(カンジダ性)およびトリコモナス性皮膚炎に

強カトリコマイシンG

抗生物質製剤(軟膏)

〔強カトリコマイシンGの特徴〕

真菌などに抗菌作用を有するトリコマイシンとグリセオフルピンの2つの抗生物質を主薬とし、患部の化膿菌に抗菌作用を有する抗生物質クロラムフェニコールおよび患部の炎症をとるヒドロコルチゾン酢酸エステルが配合されています。

⚠〔使用上の注意〕



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 粘膜(口腔、鼻腔、膣内等)、目の周囲等。
- (2) しっしん。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 患部が広範囲の人。
- (6) 湿潤やただれのひどい人。
- (7) 「しっしん」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、しっしん等他の原因による場合が多い。)

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ただれ、刺激感、疼痛

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合
- (3) 使用后、症状がかえって悪化した場合(病巣が使用前より広がる等)

〔効能〕

- 真菌性(カンジダ性)およびトリコモナス性皮膚炎
- 白癬菌症(みずむし、ぜにたむし、いんきんたむし、しらくも)

【使用法】

1日1～2回、適量を患部に塗布してください。

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 本剤の基剤として使用されている油脂成分は、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製品の品質を劣化・破損する可能性があるため、これらとの接触を避けてください。

【成分・分量】

本剤は、黄かっ色～かっ色の軟膏で、1g中に次の成分を含有する。

トリコマイシン	15万単位
グリセオフルピン	10mg (力価)
クロラムフェニコール	10mg (力価)
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg
添加物：ポリソルベート80、ワセリン	

【注意事項】



【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記に
お願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電話 03(6667)3232

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daichisankyo-hc.co.jp/>



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山市横越168