

トリアクロ® TORIKURO® 5枚入

〔効能・効果〕

ウオの目、タコ、イボ、手足のソコマメ

第2類医薬品

〔用法・用量〕

局部に膏面を内側にして貼る。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 患部の周りの皮膚につかないよう、よく注意して使用すること。

〔成分・分量〕

本品は日局絆創膏の中央に半径4.5mmの円形状に下記の成分を含むものを貼載する。

有効成分 サリチル酸30.8mg

添加物 エタノール、グリセリン、ゼラチン

ご使用にあたって

- 絆創膏の中央部のピンク色の薬を患部に貼り、3～4日間貼り続けて下さい。
- 台紙からはがす際に薬が絆創膏からはずれた場合には、薬をとり患部につけ、その上を絆創膏で抑えて下さい。
- 1回で取れない場合は2～3日後に再び貼って下さい。
- 入浴後にご使用になれば一層効果的です。
- 絆創膏に薬のシミができることがあります。効果には変わりありません。

ドイツ ジョセフ・リール商会提携
製造販売



原沢製薬工業株式会社
東京都港区高輪3丁目19番17号

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1)目の周囲、粘膜、やわらかい皮膚面(首の回りなど)、顔面等
- (2)炎症又は傷のある患部

相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)乳幼児
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談すること

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤かゆみ

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)