

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

# アスコートAD乳液

皮膚が乾燥すると、皮膚の表面の水分が不足してカサカサ肌になり、イライラするほどのかゆみが出てしまいますよね。水仕事の多い方、冷たい風によくあたる方、お年寄りや小児にも多いこの肌の乾燥状態はドライスキンと呼ばれます。そんな時、**アスコートAD乳液**をしっかりとすり込んでください。かゆみを抑えるジフェンヒドラミン塩酸塩、d-カンフル、リドカインが素早くかゆみを抑えスーッとひいて楽になります。また、尿素には角質の水分を保持する作用、角質を溶解し剥離する作用がありますので、さらっとしたなめらかな皮膚にしてくれます。

乳液タイプですので、少量でも広範囲になじみやすく、しっとり潤います。乾燥してつらい季節には、**アスコートAD乳液**で早めにお手入れしてくださいね。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂（ひび割れ）部位。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4) 炎症部位（ただれ、赤く腫れているところ。）



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師による治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

## 効能・効果

かゆみをともなう乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚）

## 用法・用量


1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守って使用してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに、水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用のみに使用し、内服しないでください。
- (5) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (6) 患部やその周辺の汚れを落としてから使用してください。
- (7) 化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

①かゆみ止め成分が浸透してかゆみを抑えます。

②尿素が角質層に水分を保持します。



● ジフェンヒドラミン塩酸塩 ● d-カンフル



● 尿素 ● 水分

## 成分・分量

本品100g中

成分	分量	はたらき
尿素	10.0g	角質層に水分を取り込み保持する作用により、皮ふにしっとり感を与えます。また、乾燥してカサカサになった角質層表面をなめらかにします。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、不快なかゆみやチリチリする感じを取り除きます。炎症をおさえる効果もあります。
d-カンフル	1.0g	局所をスーッとさせて、かゆみや炎症をしずめます。また、血行を改善する作用のあることもわかっています。
リドカイン	2.0g	かゆみの刺激が伝わるのを阻止するのでイライラするかゆみを楽にしてくれます。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	末梢の血行を促して、皮ふ表面に十分な酸素・栄養素の供給が促進されます。皮ふ表面の新陳代謝が活発になり、すこやかな皮ふが生まれます。

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、グリセリン、プロピレングリコール、スクワラン、パラベン、セタノール、パラフィン、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、トリエタノールアミンを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

## 包装

120g プラスチック容器入り

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

株式会社カイゲン お客様相談室

電話 06-6202-8911

受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）

発売元  **株式会社カイゲン**

大阪市中央区道修町2丁目5番14号

製造販売元  **万協製薬株式会社**

三重県多気郡多気町五桂1169-142

C2006