

この説明文書は使用前に必ずお読みください
また、必要時に読めるよう保管しておいてください

乾燥性皮膚治療薬

第3類医薬品

手の荒れ、乾燥した皮膚に

リベルタクリーム

保湿剤配合(尿素20%)クリーム

ガサガサした手、ザラザラした肌、乾燥した皮膚は水分が不足しています。これは皮膚表面の角質層の水分が不足しているのが原因です。健康な皮膚では、皮膚中の水分が丁度よい量を保っていますが、不足すると荒れて皮膚が硬くなりカサカサ、ザラザラの肌になってしまいます。こんな時にリベルタクリームを皮膚によく擦り込んでお使いください。尿素の作用により角質層内の水分を適度に調節し、症状の改善に効果のある医薬品です。



※お風呂あがり、水仕事の後、お休み前がご使用のタイミングです



〔使用上の注意〕



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれている所
- (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれている所)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書をもって医師または薬剤師にご相談ください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる

- (2) 2週間使用しても症状がよくなる場合

裏面記載もお読みください

〔効能・効果〕

- 手指のあれ
- ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症
- 老人の乾皮症
- さめ肌

〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗擦してください

用法・用量に関連する注意

- (1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
- (2) 小児（15歳未満）に使用させないでください
- (3) 外用にのみ使用してください

〔成分・分量〕

100g中に尿素20gを含有します

添加物として、クエン酸Na、エデト酸Na、セタノール、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、水酸化Na、グリシン、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸、ベヘン酸、スクワラン、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシルを含有します

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (3) 他の容器に入れかえないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は、使用しないでください

〔問合わせ先〕

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます

東光薬品工業株式会社 お客様相談室 電話03-3855-0101
受付時間 午前9：00～午後5：00（土・日・祝日を除く）

発売元

小林薬品工業株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号