

この説明書は、お薬とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。



第3類医薬品

目のかわき・目の疲れに サンテCL[®] 目薬

コンタクトレンズの装用により、涙の機能が損なわれやすくなり、目の不快感・かわき・異物感を引き起こすことがあります。

サンテCLは潤いを補って涙のはたらきを助け、コンタクトレンズを装用している時の不快感・目のかわき・目の疲れをやわらげます。

さらに、配合成分がレンズに吸着せずレンズを傷めないのので、すべてのタイプのコンタクトレンズ[ソフト・O₂・ハード・ディスポーザブル(使い捨て)]を装用したままお使いいただけます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください。

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

(2) 目のかすみが改善されない場合

(3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

用法・用量

1回2~3滴、1日3~4回点眼してください。

● 次の注意事項をお守りください。

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用のみ使用してください。



裏面につづく

効能・効果

ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)


成分・分量

成分	分量
塩化ナトリウム	0.55%
塩化カリウム	0.05%

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、ソルビン酸、ホウ酸、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。



- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4)他の人と共用しないでください。
(5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。

包装 12mL

〔自然環境に配慮し、携帯袋は添付しておりません。ご理解の程お願い申し上げます。〕

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」 電話番号 06-6321-8950
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)