

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

**目薬**

**目の疲れ・充血に**

**第2類医薬品**

**アクション<sup>®</sup>**

**アクション**には、末梢神経に働いて、目の筋肉のはたらきを活発にするシアノコバラミン（ビタミンB12）、疲れた目の調節機能を改善するネオスチグミンメチル硫酸塩、血管収縮作用により、結膜充血を取り去るナファゾリン塩酸塩等7種類の有効成分を配合し、目の疲れ・結膜充血に効果をあらわします。



目の疲れ



結膜充血

**⚠ 使用上の注意**



**【相談すること】**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 次の症状のある人  
はげしい目の痛み
  - (4) 次の診断を受けた人  
緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
  - (1) 目のかすみが改善されない場合
  - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

**【効能効果】**

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

## 【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

### <用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (6) 点眼用에만使用して下さい。



## 【成分分量】


100mL中

成分	分量	作用
ナファゾリン塩酸塩	2mg	血管収縮作用により、結膜充血を取り去ります。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	疲れた目の調節機能を改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg	紫外線などによる目の炎症を抑え、目のかゆみや充血を除きます。
シアノコバラミン (ビタミンB12)	20mg	視神経の働きを整え、目の疲れなどに効果があります。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	100mg	目の新陳代謝を促進し、目の疲れや眼病予防に効果があります。
タウリン	100mg	傷ついた目の組織修復を助け、眼病を予防します。
コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	100mg	目の乾燥を防ぎ、眼病を予防します。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、l-メントール、d-カンフル、グラニオール、エデト酸Na、クロロブタノール、パラベン、プロピレングリコールを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近くなど40℃以上になる場所に放置しないで下さい。(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の期限内にご使用下さい。



### ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室  
電話：(0748) 88-3180 (大代表)  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社  
滋賀県甲賀市甲賀町滝879