

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

目のかわき・目の疲れ

第3類医薬品

アウゲドライアイ

目薬 15mL

ドライアイとは、涙液の量が減少したり、涙液の質が悪くて、目が乾いている状態のことをいいます。ドライアイの状態になると目の表面が傷つきやすくなり、重症になると角膜の表面に傷がつくこともあります。代表的な症状としては、目の乾き・ごろごろした感じ・熱い感じ・充血・目の疲れなどがあります。アウゲドライアイはコンドロイチン硫酸エステルナトリウム、タウリン、塩類を配合した目薬で、保水性を高め角膜表面のうるおいを保ち、目の乾きを防ぎ、新陳代謝を促進します。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4)次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)2週間位使用しても症状がよくなる場合。

(効能・効果)

涙液の補助（目のかわき）、目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

●目を酷使うこんな方におすすめします。



目のかわき



目が見つかる 目がかすむ



ハードコンタクト装着時の不快感

(用法・用量)

1日5～6回、1回2～3滴を点眼してください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
容器の先がまぶたやまつ毛に触れますと、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用してください。
- (4)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。（一旦レンズをはずしてから点眼してください）
- (5)本剤は、点眼用のみ使用してください。

(キャップの開閉方法)

キャップの
あけ方
キャップをひねっ
てください。



キャップの
しめ方
カチッと音がする
まで押し下げてく
ださい。



(正しい点眼方法)

中栓が目やまつ毛に
ふれないように点眼
してください。



(成分・分量)

有効成分	
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.500%
タウリン	0.100%
塩化カリウム	0.150%
塩化カルシウム水和物	0.015%
塩化ナトリウム	0.680%
リン酸水素ナトリウム水和物	0.500%

添加物として、ベンザルコニウム塩化物、*l*-メントール、*d*-カンフル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸ナトリウム水和物を含有する。



(保管及び取り扱い上の注意)

- (1)使用後はキャップをしっかり締めて、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限（外箱に書いてあります）の過ぎたものは、使用しないでください。
- (6)開封後はなるべく早く（2ヶ月以内に）使用してください。



(お客様相談窓口)

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、薬店または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

キョーリンリメディオ株式会社 学術部

〒920-0017 金沢市諸江町下丁287番地1

☎ 0120-960189

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）