

目薬

目の疲れ・かすみに メガネを使用している方などに スマリンフォーカス

SMARIN FOCUS

○メガネをはずした後や読書による

目の疲れ・かすみに、やすらぎの一滴

メガネをかけていると、レンズを支えたり焦点を合わせようとして目が酷使され、目の神経や筋肉がストレスを受け、血行も悪くなってきます。そんなとき、目の神経や筋肉のはたらきをたすけ、疲れをとるくやすらぎの一滴がスマリンフォーカスです。



○透明袋入り

この製品の容器は、品質保持のため、透明な袋に入っています。

※携帯用の袋は入っておりません

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

- (5) 次の診断を受けた人。

緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合。

- (3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

■ 効能・効果

- 目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）
- 目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）
- 眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）
- 紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

■ 用法・用量 ■

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。


キャップ
の開け方

キャップ
を手前に
ひねって
ください。



キャップ
の閉め方

パチンと
なるまで
押し下げ
てください。



<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先がまぶた、まつ毛に触れないようにしてください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用にのみ使用してください。

■ 成 分 (12mL中)

シアノコバラミン (ビタミンB₁₂) 1.2mg
ネオスチグミンメチル硫酸塩 0.6mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.6mg
タウリン 120mg
L-アスパラギン酸カリウム 120mg
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE) 6mg
添加物として、ポリソルベート80、ホウ酸、ホウ砂、塩化ベンザルコニウム、クロロブタノール、*l*-メントール、d-ボルネオールを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)成分の結晶が容器の先につくことがあります。清潔なガーゼなどで軽くふき取ってから使用してください。
- (6)使用期限をすぎたものは使用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>