

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



点眼薬

目のかすみ・目の疲れに

ノアール[®]
40EF

ビタミンB₂・B₆・E、ピント調整成分配合

ノアール40EFは…

- 目の調子を整える3種のビタミンを配合しています。
- 末梢血管の血流をよくして、目の疲れを改善する天然型のビタミンEと粘膜を正常にして目の疲れに効果をあらわすビタミンB₆を配合しています。
- 角膜の代謝機能を高め、傷ついた組織の再生を促進し光線による眼炎等に効果をあらわす活性型ビタミンB₂を配合した黄色の澄明な目薬です。



使用上の注意



相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。
緑内障



2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

(2) 目のかすみが改善されない場合

(3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合



キャップの開閉方法

必ずキャップを上にして容器の角を持って開けてください。

●開け方


キャップを手前にひねってください。

(容器の中心を押さえたまま開けると薬液がとびだすことがあります。)



●閉め方

カチッと音がするまで押し下げてください。



【効 能】

目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、結膜充血、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

【用法・用量】

1日3～6回、1回1～3滴ずつ点眼します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕15mL中

成分	分量	働き
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	3.75mg	末梢血管の血流をよくして、目の疲れを改善します。
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (活性型ビタミンB ₂)	7.5mg	傷ついた組織の再生をうながし、光線などによる眼炎に効果をあらわします。
ビタミンB ₆	7.5mg	視神経の働きを整え新陳代謝を促進し、目の疲れに効果をあらわします。
グリチルリチン酸二カリウム	7.5mg	結膜充血、紫外線などによる目の炎症、まぶたのただれに効果をあらわします。
コンドロイチン 硫酸ナトリウム	7.5mg	角膜の表面を保護し、乾燥を防止して眼病予防に効果をあらわします。
L-アスパラギン酸カリウム	34.5mg	眼組織の新陳代謝を促進し、目の疲れに効果をあらわします。
メチル硫酸ネオスチグミン	0.75mg	目の調節機能、代謝機能の働きを整え、目の疲れに効果をあらわします。

添加物として、*dl*-カンフル、*l*-メントール、クロロブタノール、塩化ベンザルコニウム、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、等張化剤、アミノカプロン酸、ホウ酸、pH調整剤を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の点眼後、口中に甘味を感じるがありますが、これは本剤に含まれるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に伝わってくるため、ご心配ありません。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光や蛍光灯の光に当たらないようにして、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
(ビタミンB₂は光に当たると分解して退色します。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は速やかにご使用ください。
- (6) 温度40℃以上となる所に置かないでください。車の中(ダッシュボード等)や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。
- (7) 本剤は、黄色の目薬ですので、衣服につかないように注意してください。もし衣服についたときは、すぐに水で洗い流していただければシミになりません。
- (8) 容器のネジ部に成分の黄色い結晶がつくことがありますが、このような場合には清潔なガーゼなどでふき取ってから使用してください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号