

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また、  
必要な時に読めるよう大切に保管してください。

抗菌性点眼薬  
細菌性の眼疾患に

# サルファアナロン目薬

第2類医薬品

目やにが出たり、まぶたが赤くはれあがったり、涙があふれ出たりするさまざまな症状は、ブドウ球菌や連鎖球菌などの細菌が原因となっている場合が多く、速やかな治療が必要です。

**サルファアナロン目薬**は眼病の原因となる細菌の発育や増殖を抑える作用が長時間持続するスルファメトキサゾールと、目の炎症に対して抗炎症作用をあらわすグリチルリチン酸二カリウムを配合した目薬で細菌性の眼疾患に効果を示します。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
長期連用しないこと



### ■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ |

- 3～4日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効 能

結膜炎（はやり目）、ものもらい、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ

・「ものもらい」についての注意

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。

（なお、ものもらいは体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足などで体力が低下しているときに起こりやすいので、疲労をさけ、睡眠を十分とるよう心掛けてください。）

## 用法・用量

1回2～3滴を1日3～6回点眼してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。  
(目やにや雑菌等のため、薬液が汚染することがあります。)
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



## 成分・分量

100mL中

| 成分名               | 分量     | 作用                                                            |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| スルファメトキサゾール       | 4000mg | 眼病の原因となるブドウ球菌や連鎖球菌などの細菌に対して、強い抗菌力を示し、更にその効果が長く持続する持続性サルファ剤です。 |
| グリチルリチン酸<br>ニカリウム | 100mg  | 強い消炎作用を示し、目の炎症をしずめるとともに、スルファメトキサゾールの抗菌作用を増強します。               |

添加物：エタノールアミン、エデト酸Na水和物、亜硫酸Na、パラベン

＜成分に関連する注意＞

本剤の点眼により口中に苦味又は甘味を感じることがありますが、これは本剤に含まれるスルファメトキサゾール及びグリチルリチン酸ニカリウムが涙道を通して口中に流れて出てくるためで、心配ありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。)
- (4) 他の人と共用しないでください。  
(目の病気にかかっている人が使用している目薬を他の人が使用した場合、その目薬をとおして感染することがあります。)
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封後はできるかぎり早く使用してください。又、混濁したものは使用しないでください。



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話：058-278-3933  
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

## 副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

本社所在地

# 小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鷗1丁目139番地  
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号